



Indicación al Paciente
CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO

Código: IND-40

Revisión: 00

Página 1 de 2

UROCULTIVO - HOMBRES

Recoger la primera orina de la mañana, siguiendo estas indicaciones:

- Lavarse bien las manos con agua y jabón.
- Lavar el pene previa retracción del prepucio.
- Enjuagar con abundante agua y secar con toalla descartable.
- Descartar el primer chorro de orina.
- Recolectar el segundo chorro directamente en el recipiente estéril.
- Tapar el colector. **Llevar al Laboratorio inmediatamente** o refrigerar.
- Evitar tomar antibióticos 3 (tres) días previos a la recolección (salvo indicación médica).
- También se puede realizar la recolección con una retención urinaria mínima de 3 hs.

UROCULTIVO - MUJERES

Recoger la primera orina de la mañana, siguiendo estas indicaciones:

- Lavarse bien las manos con agua y jabón.
- Lavar bien la zona genital, con agua y jabón sin uso; enjuagar con abundante agua y secar con toalla descartable.
- Colocar tampón vaginal o armar uno con algodón.
- Recoger directamente la orina en el frasco estéril, descartando el primer chorro y **recolectando el chorro medio**.
- Tapar el colector. Retirar el tampón vaginal y descartar. **Llevar al Laboratorio inmediatamente** o refrigerar.
- Evitar tomar antibióticos 3 (tres) días previos a la recolección (salvo indicación médica).
- También se puede realizar la recolección con una retención urinaria mínima de 3 hs.

Elaboró: Liana Raspo	Revisó: Carlos Hellmers	Aprobó: Carlos Hellmers
Fecha: 10-10-2015	Fecha: 12-10-2015	Fecha: 16-10-2015

	Indicación al Paciente CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO	Código: IND-40
		Revisión: 00
		Página 2 de 2



UROCULTIVO – BEBÉS Y NIÑOS

Muestra al acecho: significa que debe esperar a que el bebé o niño comiencen a orinar.

Material: un colector estéril.

Recolección de la orina:

- Higienizar cuidadosamente la zona genital del bebé con jabón nuevo y agua fría (previamente hervida) varias veces de adelante hacia atrás. En los varones efectuar retracción del prepucio.
- Enjuagar con abundante agua.
- Secar con toallita descartable.
- Recoger la muestra de orina en el colector estéril con el bebé (varón) de pie, descartando las primeras gotas.
- Bebé (niña): se la coloca en posición inclinada, casi sentada (con los miembros inferiores en cuclillas) de manera que el chorro de orina no se deslice por la cara interna de los muslos.
- **Llevar al Laboratorio de inmediato** o refrigerar.
- No se aceptan muestras de orina en colectores pediátricos.



EXUDADO VAGINAL – MUESTRA DE ENDOCÉRVIX (Moco cervical)

Concurrir al Laboratorio respetando las siguientes INDICACIONES:

- 48 hs. de abstinencia sexual.
- No coincidir con la menstruación. (esperar de 5 a 6 días para realizar el estudio).
- Evitar óvulos, antisépticos, antibióticos, talco, ducha vaginal.
- Realizar una higiene externa (de genitales) para reducir la flora contaminante.

Para cultivo:

Suspender antibióticos 72hs. antes.

Elaboró: Liana Raspo	Revisó: Carlos Hellmers	Aprobó: Carlos Hellmers
Fecha: 10-10-2015	Fecha: 12-10-2015	Fecha: 16-10-2015